

ワクチン	初回	1週間	2週間	3週間	4週間	5週間	6週間	7週間	8週間	3か月	6か月	12か月+
A型肝炎	○			○		2回の接種で1年間有効					(○)	
破傷風	○	追加接種の場合 約10年有効				○						○
	1度も接種歴がない場合は最低でも2回の接種を推奨											
B型肝炎	○				○						○	
狂犬病(曝露前予防)	○	○		(○)								
日本脳炎	○		(○)								(○)	有効期間 3-4年以上
	渡航前に少なくとも1回か2回目までの追加接種を推奨											
髄膜炎菌	○	1回の接種で3-5年効果持続										
ポリオ	○				(○)						(○)	
	基礎接種がない方：初回、2回目4週間後、3回目6-12か月後											
DPT (ジフテリア・破傷風・百日咳混合)	○					○					○	
MR (麻しん・風しん混合)	○				(○)							
麻しん	○				(○)							
風しん	○				(○)							
水痘	○				(○)							
おたふく (流行性耳下腺炎)	○				(○)							
	麻しん、風しん、水痘、おたふく（流行性耳下腺炎）ワクチンは接種歴が1回あれば1回の追加接種で終了											
带状疱疹 (水痘生ワクチン)	○											
带状疱疹 (带状疱疹ワクチン)	○									○		